

CENTAUREA × PAILLERI, HYBRIDE NOUVEAU POUR LA FLORE
DU MAROC ET POUR LA SCIENCE.

Par J. ARÈNES.

Centaurea × Pailleri J. Ar., hybr. nov. — *Centaurea Boissieri* DC.
var. *atlantica* Font Quer × *C. Calcitrata* L.

Centaurea sterilis, *Centaureae Boissieri* var. *atlanticae* habitu. *Caulis erectus*, *subalbide pubescenti-araneosus*, *striato-angulosus*, *ramosus ramis patulo-erectis brevibus brevissimisve*. *Folia aspera*, *utrinque pubescenti-subalbida*, *caulinaria pinnatipartita lobis lateralibus 2-3 ovatis vel ovato-oblongis cuspidato-spinulosis*, *lobo terminali lanceolato longiore*, *lobis inferioribus auriculiformibus*, *superiora ovato-oblonga calathidia aequantia*. *Calathidia ovoideo-oblonga*, *basi rotundata*; *corollae purpureae*; *periclinium laxe araneosum cito glaberrimum*; *bracteae ovatae, fortiter 5-7-nervatae*; *appendices triangulares, decurrentes, coriaceae, subalbidae bruneaeve, in spinam suberectam subalbidam longissimam robustam vulnerantissimam et cilia 4-5 spinulosa longa recta vel apice ± recurvata utrinque gerentem longe acuminatae*, — *Typus in Herb. Mus. Paris, Pailler 816*.

Maroc. — Moyen Atlas central, val d'Ifrane, vers 1600 m. d'altitude, leg. Pailler sub n° 816; cum parentibus.